

Umgang mit Krankheitsanzeichen: Darf mein Kind in die KiTa oder Schule?

Mein Kind hat ...

Leichte Erkältungssymptome

Es ist kein negativer Virusnachweis nötig.
 Empfohlen wird jedoch ein Antigen-Selbsttest*
 in der Häuslichkeit zweimalig in den ersten 5
 Tagen ab Symptombeginn – nach Möglichkeit
 am Tag des Symptombeginns und an Tag 3.

Positiver
 Selbsttest

Kein Besuch der Einrichtung bzw. getrennte Betreuung vor Ort bis Abholung
 Vorstellung bei Haus- oder Kinderarzt/-ärztin,
 Ärztliche Entscheidung zur erforderlichen differentialdiagnostischen Abklärung der
 Symptomatik mittels PCR (o.ä. Nukleinsäurenachweis) auf SARS-CoV-2.
 Ein positiver Ag-T-Test erfordert immer eine PCR-Untersuchung.

Bitte
 tel. Kontakt
 aufnehmen,
 insbesondere
 bei Kontakt zu
 SARS-CoV-2-
 Positiven od.
 bei Geruchs,-
 Geschmacks-
 verlust

Schwere Krankheitssymptome, die ärztlicher Abklärung bedürfen

Mein Kind ist akut erkrankt, es hat ...

Anderer ärztliche Diagnose
 ohne erforderliche
 SARS-CoV-2-Testung

Negativer Test + Symptomatik mit
 Fieber oder Beeinträchtigung des
 Allgemeinzustandes, kein Besuch
 der Gemeinschaftseinrichtung

Positiver SARS-CoV-2
 Rachenabstrich(PCR o. ä.
 Nukleinsäurenachweis)

Keine Einschränkung
 Besuch der
 Gemeinschaftseinrichtung möglich

Besuch der Gemeinschafts-
 einrichtung
 (mit Selbsterklärung) nach
 ärztlicher Einschätzung möglich

Nach 48 Stunden Fieberfreiheit
 und bei deutlich gebesserter
 Allgemeinzustand Besuch der
 Gemeinschaftseinrichtung (mit
 Selbsterklärung) möglich

Kein Besuch der
 Gemeinschaftseinrichtung
 Häusliche Isolation für 14
 Tage mit Testung (Antigen-
 Selbsttest*) am Ende der
 Isolationszeit

Stand: 30.09.21,
 * Antigentest, der dem Stand der Technik entspricht, siehe https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationfile